

## (P-11) ALKOL VE MADDE BAĞIMLILARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Öyküm Bilge, Ayhan Kalyoncu, Özkan Pektaş, Hasan Mırsal, Gamze Erdoğan, Mansur Beyazyürek

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD  
Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri  
oykum\_bilge2004@yahoo.com

**GİRİŞ VE AMAÇ:** Bireysel ve toplumsal boyuttaki yansımaları ile madde bağımlılığı, çağımızda aile kurumunu ve sosyal çevreyi etkileyen önemli sorunlardan biridir. Biyopsikososyal bir hastalık olan alkol ve madde bağımlılığının tedavi öncesi, hastane tedavisi ve tedavi sonrası izleme aşamasında hastanın içinde bulunduğu sosyal çevrenin ve ailenin önemli yeri olduğu bilinmektedir. Bağımlılığın oluşması, devam etmesi, ilerlemesi ve tedavisinde sosyodemografik özelliklerin belirleyici olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı geriye dönük olarak yatarak tedavi gören alkol ve madde bağımlılarının sosyodemografik özelliklerini araştırmaktır. **GEREÇ VE YÖNTEM:** Çalışmaya 2003, 2004 yıllarında ve 2005 yılının ilk 7 ayında kliniğimizde yatarak tedavi gören 1543 alkol bağımlısı ve 1362 madde bağımlısı olmak üzere toplam 2905 hasta alınmıştır. Bu hastaların sosyodemografik özellikleri retrospektif olarak incelenmiş ve değişkenler SPSS paket programı kullanılarak sonuçlar yorumlanmıştır. **BULGULAR:** Madde bağımlısı 1362 hastanın %90.9'u erkek (n=1238), %9.1'i kadındır (n=124). Madde bağımlılarının yaş ortalaması 31.59 (sd=9,1) dir. Eğitim durumu; %46.3'ü ilköğretim, %43.4'ü ortaokul, %9.3'ü lise, %1'i üniversite mezunu şeklindedir. Alkol bağımlısı hastaların yaş ortalaması 43.52 (sd=9,5) bulunmuştur. Alkol bağımlısı 1543 hastanın %86.3'ü erkek (n=1332), %13.7'si kadındır (n=211). Alkol bağımlılarında medeni durum; %20.1'i bekar, %63'ü evli, %14.3'ü boşanmış, %2.6'sı dul şeklindedir. **TARTIŞMA VE SONUÇ:** Bu çalışmanın sonucunda hem alkol hem madde bağımlılarında erkek cinsiyetin fazlalığı dikkat çekicidir. Madde bağımlılarında alkol bağımlılarına oranla yaş ortalamasının daha düşük olduğu gözlenmiştir. Her iki grupta da evli olanların oranı daha yüksek bulunmuştur. Sosyodemografik özelliklerin bağımlılık sürecindeki yerini belirlemek için daha geniş hasta gruplarında ayrıntılı değerlendirmeler yapılması gerektiğini düşündürmektedir.