

(P-23) PRİMER HASTALIKLARDA SEKONDER MEPERİDİN KÖTÜYE KULLANIMI

Şengül Çavaş, Selime Çelik, Gözde Durlanık, Ercan Dalbudak, Cüneyt Evren, Duran Çakmak

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

sengulcavas@hotmail.com

Meperidin hidroklorid, sentetik opioid bir madde olup 1939 yılında sentezlenmiştir (1). Tıpta operasyon öncesi hazırlık döneminde ve operasyon sonrası ağrıların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır (1,2). Narkotik analjezik olan meperidin akut ve kronik ağrıda da kullanılmaktadır. Özellikle sağlık görevlilerinde meperidin kötüye kullanımına sık rastlandığı bildirilmektedir. Sağlık personelinin meperidin temininin kolay olması, bağımlılık gelişimini kolaylaştıran bir faktördür (3). AMATEM'e başvuran farklı hastalıkların (pankreas kanseri, rektum kanseri, kronik ITP, kronik karın ağrısı, geçirilmiş inguinal herni operasyonu, kronik açıklanamayan sırt ağrısı) tedavisi nedeniyle meperidin başlanan ve sonrasında meperidin kötüye kullanımı gelişen 6 olgunun klinik ve sosyodemografik özellikleri yönünden gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Akut ve kronik ağrı sırasında meperidin tedavisi başlanan olguların izlenmesinde dikkatli olunması gerektiği yapılan çalışmalar ve klinik gözlemimizde ortaya çıkmıştır.

KAYNAKLAR

1. Jiang Z. Iatrogenic addiction of petidine: clinical feature and experience of detoxification. (Abstract) Zhonghua shen Jmg Jing Shen Ke Za Zhi 1992; 25(2): 85-7,126.
2. Türkcän A, Çakmak D. Sağlık personellerinde meperidin kötüye kullanımı: Üç olgu. Bahar Sempozyumları 2. kitabı, Side/Antalya, 1998 s 50.
3. Strang J, Wilks M, Wells B ve ark. Missed problems and missed oppurtinities for addicted doctors. BMJ 1998;316: 405-406.